

Kalendarz szczepień obowiązkowych

Wiek	Szczepienia przeciw	Uwagi
W ciągu 24 godzin po urodzeniu	WZW typu B -domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŻLICY – śródskórnie szczepionką BCG	Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. Od szczepienia przeciw WZW typu B.
2 m.ż. – 6-8 tydzień po sześciu tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B)	WZW typu B -domięśniowo (druga dawka) POLIOMYELITIS -podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka) (pierwsza dawka) -podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP	Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6-7 miesiąca życia. Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-tygodniowych. Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP. W przypadku orzeczenia całkowitego przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT.
Przełom 3 i 4 m.ż. (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TEŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS -podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)	Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki – szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia

Wiek	Szczepienia przeciw	Uwagi
		jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.
5 m.ż. (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) - podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS – podskórnio lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)	
Przełom 6 i 7 m.ż. (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	WZW typu B -domięśniowo (trzecia dawka)	
13-14 m.ż.	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE -podskórnio żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)	Szczepienie podstawowe. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.